

## O-129G

### Lesão vesicobolhosa?

Chicrala \*GM, Battisti MPL, Zen Filho EV, Silva Santos OS, Damante JH  
USP - Universidade de São Paulo - Faculdade de Odontologia de Bauru

Homem mulato, de 51 anos, referia “bolhas” na gengiva há cinco anos e que dificultava sua alimentação. À inspeção intraoral, apresentava bolhas de 1 cm de diâmetro na gengiva ceratinizada e mucosa alveolar. Foi realizada biópsia excisional de uma bolha, com diagnóstico presuntivo de pênfigo vulgar, penfigoide benigno das mucosas ou líquen plano erosivo. A microscopia revelou hiperplasia epitelial com discreta alteração hidrópica, com epitélio totalmente separado do tecido conjuntivo, compatível com penfigoide benigno das mucosas. O Penfigoide benigno das mucosas é uma doença crônica autoimune, de causa desconhecida, caracterizando-se por bolhas ou vesículas e ulcerações em qualquer região da mucosa oral, além de gengivite descamativa, podendo apresentar manifestações cutâneas e oculares. Foi prescrito celestone tópico, uma vez ao dia e o paciente foi encaminhado ao dermatologista e oftalmologista para avaliação e tratamento sistêmico.

[gabriela.chicrala@usp.br](mailto:gabriela.chicrala@usp.br)