



DOI:<http://dx.doi.org/10.21270/archi.v5i0.1795>

VIII Jornada Odontológica da UNICASTELO

“Prof. Me. Paulo Henrique Bortoluzo”

Campus Fernandópolis

22 a 26 de agosto de 2016

**Cine Shopping Fernandópolis – Shopping Center Fernandópolis
Fernandópolis – SP**

P 32. A INCIDÊNCIA CÁRIE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

MULATO, BÁRBARA DIAS; FRANCESCHINI, ANA CAROLINA ALVES; SOUZA, JÉSSICA PEREIRA DE; SILVA, JÉSSICA CRISTINA DA; CARREIRA, HEITOR DE SOUZA; SILVA, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA; ANTONIO, REGINA ROBERTA; ROSA, ANA PAULA BERNARDES. Universidade Camilo Castelo Branco - UNICASTELO - Campus Fernandópolis.

A dentição decídua não tem recebido a mesma atenção dispensada à dentição permanente, mesmo sabendo que ela desempenha funções importantes como uma formação harmoniosa e fisiológica da estrutura facial. Estudos afirmam que a perda dos dentes decíduos precocemente pode causar nas crianças distúrbios de fonação, redução da capacidade mastigatória, problemas psicológicos, má oclusão e hábitos bucais viciosos, como a interposição lingual. O objetivo deste trabalho é através de revisão de literatura, demonstrar métodos de prevenção para cárie de mamadeira em elementos decíduos. Concluiu-se que a atenção odontológica deve começar o mais cedo possível, pois as bactérias começam a colonizar a cavidade bucal da criança durante o nascimento. Métodos de prevenção devem ser aplicados imediatamente após o nascimento.

Descritores: Cárie; Prevenção; Boca.