

## **Caso atípico de impacção dentária em região de cabeça da mandíbula: relato clínico**

Oliveira RP\*<sup>1</sup>, Fuziy A<sup>1,2</sup>, Roque JS<sup>1</sup>, Costa ALF<sup>2</sup>, Freitas CF<sup>2</sup>, Pastori CM<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Curso de Odontologia, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Jacarezinho, PR, Brasil

<sup>2</sup>Departamento de Ortodontia, Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, São Paulo, SP, Brasil

<sup>3</sup>Curso de Odontologia, Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI, Adamantina, SP, Brasil

A impacção é uma condição patológica em que um dente não irrompe na cavidade bucal, dentro do limite normal de tempo. A migração dentária de um dente impactado é uma anomalia que ocorre frequentemente na mandíbula e envolve os caninos e molares. A prevalência de pré-molares inferiores impactados é baixa e, quando se manifesta mostra uma predominância para a unilateralidade. O presente trabalho objetivou apresentar o relato de um caso clínico de uma paciente xantoderma com a idade cronológica de 21 anos e que procurou o atendimento clínico universitário e no exame radiográfico observou-se a presença de segundo pré-molar inferior esquerdo incluso e numa posição ectópica, próximo ao ângulo mandibular. A paciente foi alertada sobre a opção terapêutica envolvendo a exodontia desse elemento dentário, entretanto, recusou-se em realizá-lo. Retornou 3 anos após, apresentando a queixa de desconforto na região pré-auricular esquerda e limitação na abertura bucal e um novo exame radiográfico evidenciou a migração dentária para cima e, novamente, não aceitou a abordagem terapêutica proposta. Um exame radiográfico e tomográfico realizado 2 anos após demonstrou que o elemento dentário incluso havia migrado para a região da cabeça da mandíbula e, nesta ocasião aceitou passar pela cirurgia de remoção do dente.

**Descritores:** Dente não Erupcionado; Erupção Ectópica de Dente; Cirurgia Bucal.