



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v6i0.2255>

OCCL-001

## A correlação de síndromes relacionadas ao estímulo gustativo: síndromes de Frey e Lágrimas de Crocodilo

Oliveira D, Gomes-Ferreira PHS, Carrasco LC, Palin LP, Abreu-Costa L, Gonçalves PZ, Botacin PR, Okamoto R

Área: Propedêutica

A sudorese ao longo da distribuição do nervo auriculotemporal e o lacrimejamento unilateral excessivo em decorrência a estímulos gustativos são características, respectivamente, das síndromes de Frey e Lágrimas de crocodilo. O objetivo do presente trabalho é relatar dois casos clínicos de síndrome de Frey e síndrome das lágrimas de crocodilo, visando diagnóstico, acompanhamento e escolha do tratamento adequado. Caso 1 – Síndrome de Frey: paciente 38 anos de idade, gênero feminino, vítima de queda de própria altura com trauma em face. Sem traços de fratura ao exame clínico e radiográfico, leve algia em região de articulação temporo-mandibular direita a mastigação, rubor e sudorese na região auriculotemporal ao se alimentar. O tratamento foi somente conservador com remissão total dos sintomas. Caso 2 – Síndrome das lágrimas de crocodilo: paciente gênero feminino, com histórico de paralisia de Bell, lacrimejamento do olho esquerdo no ato da mastigação e ausência de dor. A paciente optou somente pelo acompanhamento periódico do caso. Conclui-se que o tratamento das síndromes de Frey e lágrimas de crocodilo está diretamente ligado a etiologia e evolução, em que quadros brandos devem ser avaliados a possibilidade de remissão espontânea, quando não, o tratamento de eleição atual deve ser o menos invasivo.

**Descritores:** Paralisia de Bell; Sudorese Gustativa; Limiar Gustativo.