

Or 009

DIFERENTES ASPECTOS CLÍNICOS DO PAPILOMA ESCAMOSO BUCAL

Isabela Bombonato Tonioli, Saygo Tomo, Augusto Séttemo Ferreira, Luciana Estevam Simonato

Universidade Brasil - Campus Fernandópolis

O papiloma escamoso bucal é uma neoplasia epitelial benigna comum em indivíduos entre 30 e 50 anos de idade, ocorrendo com a mesma frequência entre homens e mulheres. Ocorre devido a uma proliferação benigna do epitélio de revestimento induzida pelo Papilomavírus humano (HPV), resultando clinicamente em lesão vegetante. Os locais de predileção são: língua, lábios e palato mole, porém, qualquer superfície bucal pode ser afetada. O diagnóstico do papiloma escamoso bucal é baseado na associação das características clínicas e histopatológicas da lesão, podendo haver, em alguns casos, a necessidade da realização de análises moleculares específicas para determinar o genótipo do HPV envolvido na ocorrência da lesão. Neste trabalho descrevemos diferentes manifestações clínicas do papiloma escamoso bucal, uma vez que o reconhecimento clínico das lesões representa o primeiro passo no processo de diagnóstico, e a partir disso, o clínico pode estabelecer um diagnóstico diferencial e tomar conduta adequada para a obtenção de um diagnóstico definitivo. Com isso, verificamos que o papiloma escamoso bucal pode apresentar características clínicas variáveis que muitas vezes confundem o clínico, resultando em má comunicação com o paciente a respeito da lesão e até conduta inadequada para o diagnóstico.

Descritores: Papiloma; Papilomaviridae; Neoplasias Bucais; Diagnóstico Bucal.