



## **X Jornada Odontológica da Universidade Brasil**

*“Prof<sup>ª</sup>. Dr<sup>ª</sup>. Elisa Mattias Sartori”*

**27 a 31 de agosto de 2018**

Estrada Projetada F1, S/N - Fazenda Santa Rita

Fernandópolis - SP, 15600-000

DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3668>

### **PRÓTESE TOTAL IMEDIATA: RELATO DE CASO**

Yasmin Dutra Martins, Jaqueline Akemi Kanashiro, Daniel Fachinette Dias, Samuel Lucas Fernandes, Elisa Mattias Sartori, Adhara Smith Nobrega

Universidade Brasil - Campus Fernandópolis, Fernandópolis-SP

**Categoria:** Paineis

A prótese imediata é definida como prótese total ou parcial removível, confeccionada para que seja instalada imediatamente após extração de elementos naturais. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de uma paciente de 29 anos de idade e sexo feminino, com periodontite severa. O tratamento estabelecido foi a extração dentária e a confecção de uma prótese total imediata. Referente história médica, a paciente negou todos e quaisquer tipos de alterações sistêmicas e comprometimentos de saúde e uso de medicamentos. A paciente foi submetida a adequação do meio bucal previamente às cirurgias. Foi realizada a moldagem superior e inferior para obtenção de modelos de gesso e montagem em Articulador semi-ajustável, a seleção de cor dos dentes e gengiva. Seguindo o planejamento, realizaram-se as extrações dos elementos dentários após a anestesia local com Cloridrato de Lidocaína a 3% com Hemitartarato de Norepinefrina. A fim de possibilitar uma melhor adaptação da base de resina da prótese à área chapeável da maxila, fez-se uma ligeira osteotomia com limas ósseas para regularização de rebordo alveolar e também com broca de haste longa 702 em alta rotação. Posteriormente a ferida foi suturada com fio de seda estéril 4-0 e logo se procedeu à instalação da prótese e feitos os ajustes oclusais e utilização de resina soft para melhor adaptação e menor incômodo. Foram prescritos para paciente anti-inflamatório, analgésico e antibiótico, além de recomendações pós- cirúrgicas. Passados 2 dias, a mesma retornou à clínica para ajustes e a retenção e adaptação da prótese mantiveram-se favoráveis. Foi possível verificar a importância da prótese total imediata como ferramenta útil no pós-operatório, passando ao paciente operado uma condição estética e funcional favorável.

**Descritores:** Prótese Dentária; Exodontia; Cirurgia.