

BICHECTOMIA COM FINALIDADE FUNCIONAL EM PACIENTE PORTADOR DE MORSICATIO BUCCARUM

Felipe Franklin de Jesus, Millena Lorrana de Almeida Sousa, Lukas Natã Mendes Fragoso, Sandrielly Laís Rodrigues de Lima, Silvestre Estrela da Silva Junior, José Lucas Soares Ferreira, Julierme Ferreira Rocha
felipe.franklin159@hotmail.com

Objetivo: O objetivo deste trabalho é reportar um caso clínico de abordagem cirúrgica para remoção do corpo adiposo da bochecha. **Relato do caso clínico:** Paciente do sexo feminino, 34 anos, normossitêmica, parda, compareceu a clínica escola da Universidade federal de campina grande, queixando de mordidas frequentes na mucosa jugal próximo aos molares. Ao exame físico observamos que a mesma apresentava linhas de mordidas na região, e foi proposto o procedimento de bichectomia para a paciente, evidenciado-se as vantagens e desvantagens do tratamento. Foi solicitado ultrassonografia do músculo bucinador, bilateralmente, para mensuração da presença e volume do corpo adiposo da bochecha. O procedimento foi realizado sob anestesia local, onde foi removido 4ml do lado direito e 4.5ml do lado esquerdo. **Conclusão:** Concluimos que o procedimento foi um sucesso, tendo em vista ter atendido as expectativas da paciente minimizando a ocorrência de traumas na mucosa jugal.