

FRENECTOMIA LINGUAL PARA TRATAMENTO DE ANQUILOGLOSSIA PARCIAL: RELATO DE CASO

Tamires Vieira de Sousa, José Henrique de Araújo Cruz, Kamilla Alencar Sousa, Elaine Roberta Leite de Souza, Douglas Benício Barros Henrique, José Klidenberg de Oliveira Júnior, Bruno Firmino de Oliveira
tamires_vs@hotmail.com

Introdução: A anquiloglossia é uma anormalidade de desenvolvimento, prejudicando a amplitude de movimentos da língua e impede que esta desempenhe sua função, caracteriza-se pela inserção anormal do frênulo lingual na região de ápice lingual. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de anquiloglossia parcial submetida à tratamento de frenectomia lingual convencional para reabilitação. **Relato do Caso:** Após exame clínico realizou-se antisepsia intraoral com uso do bochecho com solução de clorexidina a 0,2% e extraoral com clorexidina a 2%. Seguidamente, sob efeito de anestesia bilateral com Cloridrato de Lidocaína a 2% associado à Epinefrina 1:100.000, laçou-se a língua com fio de sutura seda 3.0 para estabilização, pinçou-se com auxílio da pinça hemostática, então efetuou-se a incisão com lâmina de bisturi nº 15. Em seguida, divulsionou-se com tesoura metzenbaum e a sutura foi realizada com fio de sutura seda 4.0. **Conclusão:** O tratamento é efetuado por profissionais como cirurgiões dentistas o qual pode ser feito por meio de intervenções cirúrgicas, como a frenectomia lingual, que consiste na liberação do frênulo lingual através de uma incisão quando parcial. O pós-operatório deste procedimento revela rápida recuperação e previsibilidade positiva quando correlacionada a tratamento fonoaudiológico para uma reeducação.