



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3910>

## **ANÁLISE CRÍTICA ENTRE CPAP E APARELHO INTRA-ORAL PARA O RONCO PRIMÁRIO E SÍNDROME DE APNEIA E HIPOPNEIA DO SONO**

REIS, G.S. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba); DEKON, S.F.C. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba)

**Tema:** Clínica Odontológica

A Síndrome da Apneia e Hipopnéia do Sono tem aumentado sua prevalência a cada ano, pois dentre seus fatores de risco está a obesidade, cada vez mais crescente na população. Fatores anatômicos e alterações no ciclo circadiano da vida moderna contribuem para a crescente incidência ano a ano. Vários tratamentos são propostos na literatura, desde mudança de hábito, a utilização de procedimentos cirúrgicos e aparelhos para abertura da orofaringe superior. Esse trabalho tem o objetivo de comparar, através de revisão de literatura, as vantagens e desvantagens dos seguintes aparelhos: Aparelho de pressão contínua positiva (CPAP) e aparelho intra-oral (AIO).

**Descritores:** Síndromes da Apneia do Sono; Obesidade; Odontologia.