



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3910>

## **CORREÇÃO CIRÚRGICA DE HIPERPLASIA GENGIVAL INFLAMATÓRIA NA REGIÃO ANTERIOR DA MAXILA**

MORABITO, M. J. S. D. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); NAGATA, M. J. H. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba); CAMPOS, N. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba); MILANEZI DE ALMEIDA, J. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba); JANUÁRIO ARAÚJO, N. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba); SENDÃO ALVES, B. E. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba); PUNHAGUI HERNANDES, A. C. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba)

**Tema:** Clínica Odontológica

Na análise dos tecidos gengivais, deve-se considerar o estado de saúde destes tecidos, o contorno da margem gengival, a presença de papilas interproximais e a posição do zênite gengival. Na maioria dos casos em que ocorre uma desarmonia desses tecidos gengivais, há necessidade de realizar correções cirúrgicas. O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento cirúrgico de uma hiperplasia gengival inflamatória na região anterior da maxila. A paciente apresentou-se à clínica privada com queixa de dificuldade para sorrir por causa da estética deficiente na região anterior da maxila, demonstrando desejo de corrigir o problema e aumentar a coroa clínica dos dentes anteriores superiores. Na anamnese a paciente relatou que sofreu acidente de moto há 02 anos, tendo na época um trauma na região anterior e notou o problema estético após a cicatrização dos tecidos. Após anamnese e realização de exames clínico e radiográfico observou-se hiperplasia gengival na face vestibular dos dentes 11 ao 23. Realizou-se a técnica de gengivectomia nos dentes 11 ao 23 para restituir as características anatomofuncionais normais do periodonto de proteção, com o objetivo de facilitar a realização dos procedimentos de higiene bucal e melhorar a estética. Ao rebater o retalho mucoperiosteal na região anterior foram constatadas duas linhas de fratura no tecido ósseo: uma na região do dente 21 e outra na região do dente 23. Realizou-se a osteotomia nos dentes 11 e 21 com o intuito de restabelecer o espaço biológico e também frenulotomia do freio labial superior. No pós-operatório constatou-se o sucesso clínico do tratamento. Conclui-se que problemas estéticos na região anterior da maxila podem ser facilmente corrigidos pela cirurgia plástica periodontal.

**Descritores:** Hiperplasia Gengival; Gengivectomia; Osteotomia.