



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3910>

## **MIXOMA ODONTOGÊNICO MANDIBULAR: RELATO DE CASO**

AGUILLERA, M. O. (HUMAP/UFMS - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian); GOMES PAIVA OLIVEIRA, J. (HUMAP/UFMS - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian); GARCIA DE MENDONÇA, J. C. (HUMAP/UFMS - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian); GAETTI JARDIM, E. C. (HUMAP/UFMS - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian); SILVA PELISSARO, G. (HUMAP/UFMS - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian); GAVIOLI MEIRA SANTOS, A. O. (HUMAP/UFMS - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian); CAMPIDELLI OLIVEIRA, B. (HUMAP/UFMS - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian)

**Tema:** Patologia e Propedêutica Clínica

Mixoma odontogênico é uma neoplasia benigna incomum de tecido mesenquimal e que pode ser localmente invasivo, com grande predominância para os ossos maxilares. Manifesta-se clinicamente entre a segunda e terceira década de vida, e o tratamento de eleição é a ressecção cirúrgica. Deste modo é objetivo apresentar um relato de caso de paciente do gênero masculino, 32 anos de idade, feoderma, que procurou o Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo-facial do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian/ UFMS, com queixa de lesão extensa em mandíbula com cerca de dois anos de evolução. Ao exame clínico extra-oral apresenta aumento volumétrico em região mandibular esquerda, endurecida à palpação e indolor. Ao exame intra-oral apresentou ausência dos dentes mandibulares posteriores do lado esquerdo, abaulamento de ambas as corticais ósseas, lingual e vestibular, em região de corpo e ramo mandibular esquerdo, endurecido à palpação com coloração normal. Ao exame tomográfico notou-se extensa lesão em região de corpo, ramo e côndilo mandibular esquerdo, com destruição das corticais. Em junção dos dados clínicos e imaginológicos, chegou-se ao diagnóstico de mixoma odontogênico, confirmado após a biópsia incisional. Devido a extensão e agressividade do tumor, foi decidido como tratamento a hemimandilectomia e reconstrução com placa e côndilo de titânio para reabilitação. Em um pós-operatório de 130 dias, paciente apresenta boa abertura bucal e movimentos mandibulares preservados, ausência de neuropraxia, simetria facial aceitável. Em virtude do diagnóstico e extensão da lesão o tratamento empregado se mostrou satisfatório devolvendo estética e função mastigatória ao paciente.

**Descritores:** Tumores Odontogênicos; Terapêutica; Mixoma; Cirurgia Bucal.