

P-041G

Sialoadenite crônica esclerosante. Relato de caso

Ornelas* ACF, Ferreira S, Faverani LP, Bonfim BB, Fabris ALS, Barros R, Souza FA, Garcia Junior IR

UNESP – Univ Estadual Paulista - Câmpus de Araçatuba – SP

Caracterizado como uma lesão inflamatória crônica, o tumor de Kuttner (TK) ou sialoadenite crônica esclerosante (SCE) é uma rara afecção glandular. Este relato tem como objetivo reportar um caso de TK em glândula submandibular, fornecendo informações sobre suas características clínicas, tomográficas e histopatológicas. Paciente 57 anos, sexo masculino, apresentou-se com tumefação firme da glândula submandibular e queixa de sintomatologia dolorosa ao se alimentar com história de evolução de 2 meses. Nos exames radiológicos, imagem circular, radiopaca/hiperatenuante, com limites definidos, sugestiva de cálculo salivar. O tratamento proposto foi a excisão da glândula sob acesso submandibular, sob anestesia, intubação orotraqueal, com ausência de complicações. Em resumo, o SCE, facilmente distinguido de neoplasia, não possui características clínicas e histológicas de malignidade. Embora denominado “tumor”, não é uma neoplasia, e sim um processo benigno, que clinicamente confunde e perturba o profissional pela extensão e consistência de sua tumefação. Neste caso, as características clínicas e histopatológicas são condizentes a SCE e a presença do sialólito sugere a sialolitíase como seu fator etiológico.

krlla_ana@hotmail.com